


# **IMPACTO GLOBAL DE LAS DEMENCIAS**


Lic. Enza Mastropietro

Coordinadora del área asistencial de  
la Fundación Alzheimer de Venezuela



Estudio	10/66	Maracaibo
Número total de sujetos	N=1957 (aprox)	N= 1539
DX. de demencia	7%	14.7%
Procedimientos dx.	10/66 7% DSM-IV 2.6%	
Edad	2.79% 65-69 23.4% 80 o más	14.7% más de 55 57% 85 o más
Otros factores de riesgo	No sexo Si educación Mayor depresión	
Tipos de demencia		Alzheimer 73.1 % Vascular 11 % Mixta 2.6%

# Demencia a Nivel Mundial



En el 2010, 57.7% de las personas con demencia viven en países de bajos y medianos ingresos e incrementará a 63.4% para el 2030 y a 70.5% para el 2050.



**El Estímulo**

SECCION A AÑO CIV N°30344  
Sábado, 9 de agosto del 2008

**La República** 13



**La falta de electricidad** trastorna las intervenciones quirúrgicas.



PERSONAS que reciben diálisis demandan mayor atención.

**En el Aybar  
hay problemas  
con la diálisis**



# Discapacidad y demencia


- Enfermedades crónicas no contagiosas se están volviendo rápidamente la causa dominante de trastornos de salud en países subdesarrollados.
- Las personas mayores tienen otras condiciones de salud que interactúan de manera compleja creando discapacidad y determinando el nivel de dependencia = “necesidades de cuidado”.

# Discapacidad y Demencia

- Una metodología alternativa para medir el impacto de la enfermedad crónica es el indicador DALY. Los efectos de vivir un año con discapacidad, depende del peso que tenga una condición específica de salud sobre discapacidad.
- Estudios de la OMS reportan que la demencia tiene el más alto peso de discapacidad con la excepción de trastornos severos del desarrollo.
- La gran mayoría de los pacientes con demencia son cuidados por su familia

# Todas las personas con demencia experimentan algún grado de discapacidad funcional

The prevalence of needs for care among people with dementia (10/66 Dementia Research Group population-based studies, data release 2.2)



# Impacto familiar

- Cuidadores de personas con Alzheimer y otras demencias usan un promedio de 1.6 horas diarias asistiendo con actividades personales centrales del diario vivir (incluyendo aseo, vestido, peinarse, uso del sanitario, comida).
- Al incluir el tiempo usado asistiendo con actividades instrumentales del diario vivir (como cocinar, ir de compras, lavado de ropas, finanzas de la casa) el tiempo aumentó a unas 3.7 horas.
- Cuando la supervisión general se tomó en consideración el promedio de tiempo usado en cuidar aumentó a 7.4 horas por día.

# Cuidador

- La provisión de cuidado extraordinario, excediendo los límites de lo que es normativo o usual en la relación familiar.
- Conlleva a un gasto significativo de energía de tiempo y de dinero sobre un periodo de tiempo potencialmente largo.
- Conlleva tareas que pueden ser desagradables e incómodas y que son psicológicamente estresantes y físicamente extenuantes

# Consecuencias del cuidado

- La mayoría de familiares y amigos que proveen cuidado informal se enorgullecen de su role y perciben muchas cosas positivas.
- En Canada, 80% de una muestra representativa de cuidadores de PCD identificaron muchos aspectos positivos, incluyendo compania (23%), plenitud (13%) disfrute (13%), proveer calidad de vida (6%), y significado (6%).
- Sin embargo, los cuidadores de PCD también experimentaron, altos niveles de sobrecarga, morbilidad psicológica y dano en salud física.

Rev Neurol 2008 January 16;46(2):89-96.



# Conclusiones

- El mundo está enfrentando una epidemia de proporciones sin precedentes.
- Sus efectos se sentirán particularmente en países de bajos y medianos ingresos, los que están menos preparados para enfrentar el reto.
- Los costos sociales se elevarán inexorablemente, por la creciente necesidad de cuidados a largo plazo.

# Conclusiones

- El apoyo social informal es insuficiente ante las necesidades de atención de los adultos mayores con demencia. Se requiere mayor ayuda práctica, en comparación con la informacional y la emocional
- Se requiere una política de atención al adulto mayor que atienda a las enfermedades crónicas que conllevan discapacidad.